

NUEVAS LOCALIDADES PARA ARAGÓN Y PRIMERAS CITAS EN HUESCA DE *COLUBER HIPPOCREPIS*

José Damián MORENO RODRÍGUEZ¹

La distribución de la culebra de herradura (*Coluber hippocrepis*) se circunscribe a la península Ibérica, noroeste de África y sur de Cerdeña (ARNOLD y BURTON, 1982). En España se cita en el este y sur, sin llegar a conocer bien el límite norte de su área de distribución (SALVADOR, 1985).

En Aragón la especie es poco conocida: existen observaciones tan sólo en algunas localidades de Zaragoza y de Teruel (FALCÓN y CLAVEL, 1987), no habiendo sido citada nunca en la provincia de Huesca. Por tanto, estas localidades constituyen las primeras para el Altoaragón y la de Zaragoza amplía su área de distribución conocida en esa provincia.

Todos los ejemplares fueron localizados en zonas secas y pedregosas con orientación sur y una vegetación compuesta de matorral bajo y disperso, en su mayoría romeral.

El 9 de junio de 1989 es capturado un ejemplar de 1 m de longitud en «Valdeliesma», Fraga (Huesca), a 320 m s/m en coordenadas UTM 31TBF 5285.

¹ jdmorenohu@gmail.com

El 14 de julio de 1989 se captura otro de 1,20 m de longitud en «Romaldo», Fraga (Huesca), a 300 m s/m en coordenadas UTM 31TBF6588.

El 4 de junio de 1990, a las 19:00 hora solar es observado un ejemplar en «Valdecarreras», Torrente de Cinca (Huesca), a 300 m s/m en coordenadas UTM 31TBF7590.

El 18 de octubre se observa un espécimen en el «barranco de La Perdiz», Mequinenza (Zaragoza), a 320 m s/m en coordenadas UTM 31TBF6988.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNOLD, E. N. y BURTON, J. A. (1982). *Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de España y Europa*. Ed. Omega. Barcelona.
- FALCÓN, J. M. y CLAVEL, F. (1987). Nuevas citas de Anfibios y Reptiles en Aragón. *Revista Española de Herpetología*, 2: 83-130. Madrid.
- SALVADOR, A. (1985). *Guía de Campo de los Anfibios y Reptiles de la península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. Ed. S. García. Madrid.