

**PRIMERAS CITAS DE *CHALCIDES BEDRIAGAI*
EN LA PROVINCIA DE HUESCA**

José Damián MORENO RODRÍGUEZ¹

Endemismo ibérico, el eslizón ibérico se distribuye por la práctica totalidad de la península (ARNOLD y BURTON, 1982; SALVADOR, 1985). En Aragón tan sólo se cita en algunas localidades de Teruel y Zaragoza (FALCÓN y CLAVEL, 1987; SALVADOR, 1985); no existen observaciones en Huesca, por lo que éstas constituyen las primeras de la provincia.

Se trata de una especie de difícil localización; vive en lugares con poca cobertura vegetal y permanece oculto bajo piedras y troncos o enterrado. Todos los ejemplares encontrados se hallaban en este tipo de hábitat.

El 9 de julio de 1988 se recoge un ejemplar muerto entre los restos de presas bajo un nido de cernícalo primilla (*Falco naumanni*), en Fraga (Huesca), en la cuadrícula UTM de 10 x 10 km 31TBG6000.

¹ C/ Inmaculada, 13-4° B. E-22400 MONZÓN (Huesca).

El 29 de agosto de 1989 se captura un individuo de 12 cm de longitud en el «barranco Torn de Dios», en Fraga (Huesca), a 300 m s/m en cuadrícula 31TBF7090.

El 11 de septiembre de 1989, un ejemplar de 12 cm es capturado en el «barranco Torn de Dios», en Fraga (Huesca), a 200 m s/m en cuadrícula 31TBF7090.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNOLD, E. N. y BURTON, J. A. (1982). *Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de España y Europa*. Ed. Omega. Barcelona.
- FALCÓN, J. M. y CLAVEL, F. (1987). Nuevas citas de Anfibios y Reptiles en Aragón. *Revista Española de Herpetología*, 2: 83-130. Madrid.
- SALVADOR, A. (1985). *Guía de Campo de los Anfibios y Reptiles de la península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. Ed. S. García. Madrid.